En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation par EDP Sciences de cookies d'audience et sur certaines pages de cookies de réseaux sociaux. En savoir plus et paramétrer

edp sciences Revues Livres Congrès Authentification abonné Mon compte EDPS

THÉRAPIE Tous les numéros N° spéciaux Présentation rechercher Menu

Accueil ▸ Tous les numéros ▸ Volume 66 / Numéro 6 (Novembre-Décembre 2011) ▸ Therapie, 66 6 (2011) 517-525 ▸ Résumé

Numéro	Therapie **Volume** 66, Numéro 6, Novembre-Décembre 2011
Page(s)	517 - 525
Section	Pharmacovigilance / Pharmacovigilance
DOI	https://doi.org/10.2515/therapie/2011073
Publié en ligne	21 décembre 2011

Thérapie 2011 Novembre-Décembre; 66 (6): 517–525

Réactualisation de la méthode française d'imputabilité des effets indésirables des médicaments

Update of the French Drug Reaction Assessment Method

Cercle de Réflexion sur l'Imputabilité (CRI)

Yannick Arimone[1], Irène Bidault[2], Jean-Paul Dutertre[3], Marie Gérardin[4], Claire Guy[5], Françoise

Acheter un accès : **40€**

- Accès illimité à l'article complet
- Téléchargement instantané du PDF

Ajouter au panier

Sommaire

Article

J'accepte

Résumé PDF (195.7 KB) Références

Services

Article cité par

CrossRef (32)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation par EDP Sciences de cookies d'audience et sur certaines pages de cookies de réseaux sociaux. En savoir plus et paramétrer

Marie-Blanche Valnet-Rabier

[1] Cellule Plan de Gestion de Risque, Afssaps, Saint-Denis, France

[2] Département de Pharmacovigilance, Afssaps, Saint-Denis, France

[3] Pharmacovigilance, Laboratoire Orphan Europe, Puteaux, France

[4] Service de Pharmacologie Clinique, CHU Nantes, France

[5] Centre Régional de Pharmacovigilance et de Renseignement sur le Médicament, CHU Saint-Étienne, France

[6] Centre Régional de Pharmacovigilance et de Renseignement sur le Médicament, CHU Bordeaux, France

[7] Centre Régional de Pharmacovigilance et de Renseignement sur le Médicament, CHU Montpellier, France

[8] Pharmacovigilance, Laboratoire Lilly, Suresnes, France

[9] Global Pharmacovigilance & Epidemiology, Sanofi-Aventis Research & Development, Chilly-Mazarin, France

[10] Centre Régional de Pharmacovigilance et de Renseignement sur le Médicament, CHU Besançon, France

Correspondance et offprints : Marie-Blanche Valnet-Rabier, Centre Régional de Pharmacovigilance, Centre Hospitalier Universitaire de Besançon, 2 place Saint-Jacques, Bâtiment L, 25030 Besançon Cedex, France. E-mail : methodecri@googlegroups.com

Reçu : 10 Février 2011 | **Accepté :** 1 Juillet 2011

Résumé

Un groupe tripartite, le Cercle de Réflexion sur l'Imputabilité (CRI), associant des pharmacovigilants du réseau français des centres régionaux de pharmacovigilance, de l'industrie pharmaceutique, et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a travaillé pour réactualiser la méthode française d'imputabilité. Après analyse des forces et faiblesses de cette méthode, plusieurs points d'amélioration sont proposés : une formulation plus précise et une cotation plus discriminante de certains critères chronologiques et sémiologiques, une distribution élargie du score d'imputabilité intrinsèque de 5

- Base de données EDP Sciences
- PubMed

Recommander cet article

Exporter cette référence

Articles similaires

Tremblements et mouvements anormaux aigus d'origine médicamenteuse

Thérapie 2004 Janvier-Février; 59 (1):97-103

Acamprosate (Aotal®) : les effets indésirables peuvent-ils entraver le traitement du sevrage alcoolique ?

Thérapie 2003 Juillet-Août; 58 (4):371-374

Arrêt cardiaque récupéré sous varénicline : à propos d'un cas

Thérapie 2009 Janvier-Février; 64 (1):65-66

Plus

Partagez

J'accepte

Pour les lecteurs

Alerte courriel

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation par EDP Sciences de cookies d'audience et sur certaines pages de cookies de réseaux sociaux. En savoir plus et paramétrer

plus pertinente du rôle du médicament dans la survenue d'un effet indésirable. De plus, elle constitue un outil pédagogique pour l'évaluation du niveau de relation entre la prise d'un médicament et la survenue d'un effet indésirable.

Abstract

A tripartite group, entitled « CRI » (for *Cercle de réflexion sur l'imputabilité*), involving French pharmacovigilance staff from the French network of the Regional centers of pharmacovigilance, from pharmaceutical companies, and from French Health Authorities (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) has worked to update the French drug reaction assessment method. Following assessment of strengths and weaknesses of the previous method, several points for improvement are proposed: a more precise wording and a more discriminating scale for some of the chronological and semiological criteria, a wider distribution of the intrinsic score from 5 to 7 levels, a new bibliographic scale for differentiating expected and unexpected adverse drug reactions, and a new informativness scale. This updated method would lead to a more relevant assessment of relationship between a drug and the occurrence of an adverse reaction. Furthermore, this method is a teaching tool to assess the level of relationship between a drug and the occurrence of an adverse reaction.

Mots clés : effet indésirable / imputabilité / algorithme / pharmacovigilance

Key words: adverse drug reaction / causality assessment / algorithm / drug safety

© 2011 Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique

J'accepte

Thérapie

ISSN : 0040-5957 - eISSN : 1958-5578

© Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation par EDP Sciences de cookies d'audience et sur certaines pages de cookies de réseaux sociaux. En savoir plus et paramétrer

Mentions légales Contacts Données personnelles

A Vision4Press website